

## **Bouvreuil des Açores - *Pyrrhula murina***

Ordre : Passeriformes

Famille : Fringillidae

**Répartition** : *endémique des Açores*

**Taille** : env 17 cm

**Poids** : 30 g



Le Bouvreuil des Açores est une espèce de passereau considérée auparavant comme la sous-espèce du **Bouvreuil pivoine**, elle a aujourd'hui le statut d'espèce à part entière.

### ❖ **HABITAT ET MOUVEMENTS DE L'ESPECE (nidification, migration, ...)** :

Le bouvreuil des Açores, ou Priolo en portugais, est une espèce endémique de l'est de l'île de Sao Miguel de l'archipel des Açores. La BirdLife International considère le Priolo comme une espèce "gravement menacée d'extinction". Son habitat est la forêt de lauriers sauvages macaroniques ou laurisylve. Le Priolo a un territoire très limité géographiquement, on le retrouve seulement dans la Serra da Tronqueira, dans l'île de Sao Miguel, où le sommet culminant est le Pico da Vara (1103 m.). C'est un territoire de moyenne montagne, constitué de basalte et qui est la partie la plus ancienne de l'île (4 millions d'années).

### **Le saviez-vous ?**

Le bouvreuil des Açores est l'espèce la plus menacée d'Europe.

C'est une espèce protégée par une loi portugaise.

Le site de Pico da Vara (Sao Miguel) a été classé réserve naturelle et **Natura 2000**.

### ❖ **DESCRIPTION GENERALE** :

Contrairement au bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*), le bouvreuil des Açores n'a pas de différence morphologique entre le mâle et la femelle. Il est pourvu d'un bec noir, court et puissant. Le plumage de son dos est gris-bleu, les ailes et la queue sont noires ainsi que le dessus de la tête. La poitrine et le ventre sont gris orangé.

### ❖ **REGIME ET COMPORTEMENT ALIMENTAIRE**

Le Priolo est totalement dépendant de la laurisylve. Son régime alimentaire est basé sur la période de floraison des espèces de la forêt. Chaque mois le Priolo change d'espèces de plantes ou de fougères pour se nourrir. Aux Açores, il est la seule espèce d'oiseau à manger des spores de fougères.

### ❖ **REPRODUCTION ET NIDIFICATION** :

Les nids consistent en une coupe extérieure, assez épaisse, de brindilles avec un revêtement intérieur d'herbe et de mousse. La taille de la ponte est inconnue mais l'apparition progressive de juvéniles dans les environs suggère que deux jeunes par nichée sont habituellement élevés.

**A noter** : le Priolo pose la problématique de conservation d'une espèce rare en milieu insulaire. Une île est un milieu isolé où l'espace et les ressources sont limités. La disparition de son habitat est la première cause de sa diminution démographique. En 1995, des opérations de limitation de la flore exotique et de plantation de laurier ont été entreprises avec, comme objectif, de maintenir une population viable du bouvreuil des Açores.