

## Buse variable - *Buteo buteo*

Ordre : Accipitriformes

Famille : Accipitridae

**Répartition** : Europe centrale, Asie, partie de l'Afrique

**Taille** : 50 à 55 cm (envergure de 110 à 130 cm)

**Poids** : 630 à 1300 g

**Longévité** : 25 ans



### ❖ HABITAT ET MOUVEMENTS DE L'ESPECE (nidification, migration, ...) :

C'est un rapace que l'on rencontre en Europe centrale et dans une partie de l'Asie. Certains individus hivernent en Afrique du sud-est. Elle est essentiellement sédentaire en France, mais on observe un erratisme en automne-hiver. En hiver, de nombreuses buses originaires d'Europe centrale, orientale et septentrionale viennent dans l'ouest du continent. Cela explique que l'espèce y soit toujours plus abondante à cette saison.

### **Le saviez-vous ?**

Le nom de l'archipel provient du mot portugais "açor", signifiant "autour". En effet, à l'époque de la découverte de l'archipel, on supposait que cette espèce d'oiseau était courante sur ses îles. Cependant, il semble en réalité que l'autour n'ait jamais été présent sur les îles des Açores, et que les premiers explorateurs aient confondu l'autour avec une sous-espèce locale de buse variable, les deux oiseaux présentant il est vrai, plusieurs similitudes physiques.

### ❖ DESCRIPTION GENERALE :

La Buse variable est une espèce de rapaces diurnes aux formes lourdes, au bec et aux serres faibles. Elle est souvent confondue avec le milan noir qui lui a la queue échancrée ; la buse, elle, a la queue arrondie.

### ❖ REGIME ET COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

La buse variable se nourrit essentiellement de rongeurs, de reptiles, d'insectes et de petits oiseaux. C'est donc un oiseau carnivore. Mais lorsque survient l'hiver, la buse voyant ses sources de nourriture réduites peut se nourrir de charognes et principalement de vers de terre lorsque les champs sont détrempés. La buse est en quelque sorte un oiseau opportuniste.



### ❖ REPRODUCTION ET NIDIFICATION : avril à juillet

Les buses nichent dans les arbres, mais n'y dorment pas, elles le feront quand elles auront leurs petits, souvent le nid est fabriqué à même le sol, en attendant elles dorment sur des branches. On peut aussi en observer aux abords des grandes villes.

Nombre de couvaisons : une couvée.

Nombre d'œufs : 1 à 4 œufs blancs plus ou moins tacheté de brun.